

Trigo



Nombre Común: Trigo

Nombre Científico: Triticum Aestrium,
Triticum Turgidum L.
ssp. durum.

Regiones Naturales: Desde la Costa o
Chala hasta Quechua
y Suni (0 msnm - 4000
msnm).

Principales productores



Requerimiento de Suelo

Se desarrolla mejor en suelos
con textura franco, franco
limoso, arcillo limoso y arcillo
arenoso, moderadamente
profundo y profundo (> 100cm),
con buen drenaje y alto
contenido de materia orgánica.



pH

6.1 - 6.5 y 6.6 - 7.3




Contenido de materia orgánica

> 4%

Variedades

Atahualpa	Espigón
Bravador	Moray
Centenario	Platinum
Crown	San Francisco
El Molinero	San Isidro
El Nazareno	Santa Elena
Espiga Misha	Vicseño

Estado Fenológico



Parte aérea	Germinación		Emergencia		Desarrollo de hojas - Tercera Hoja		Desarrollo de partes vegetativas - Macollaje		Desarrollo de partes vegetativas - Encañado		Aparición del órgano floral - Espigado		Floración		Formación del grano - Maduración Lechosa		Formación del grano - Maduración Pastosa		Senescencia	
Parte radicular																				
Ocurrencia de la fase (dds) ¹	0	4	5	29	30	39	40	64	65	84	85	110	111	174	175	184	185	194	195	205
Temperatura óptima (°C)	15	20	15	20	15	20	18	25	18	25	18	22	25	30	25	30	25	30	25	30
Temperatura crítica (°C)	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	12	30	12	30	12	30	12	30	12	30
Humedad óptima (%)	60	80	60	80	60	80	60	80	60	80	60	80	60	80	60	80	60	80	60	80
Déficit hídrico	Sensible		Sensible		Sensible		Sensible		Sensible		Sensible		Sensible		Tolerante		Tolerante		Tolerante	

*dds¹: días después de la siembra


Calendario de Producción Mundial (Cosechas)

Hemisferio Norte

- Canadá
- Estados Unidos
- Ucrania
- Rusia
- China
- Francia
- India
- Pakistán
- Rumania
- Alemania

Hemisferio Sur

- Perú
- Argentina
- Brasil
- Australia



Calendario de Cosechas en Piura



Calendario de Cosechas en Perú



Participación Cosecha 0% 50% 100%

Ciclo Productivo



Control Fitosanitario Riego y Fertilización No incluye la etapa Incluye la etapa